المستشفى:

التخدير الخاص بالإجراءات الطبية

من ضمن علاجك في قسم الطوارئ تم إعطاؤك دواءً مخدراً أثناء الإجراء الطبي التالي لك:

_____

_____

نقترح عليك أن ترتاح خلال الـ١٢ ساعة المقبلة لتتيح لمفعول هذه الأدوية أن يتلاشي كلياً.

بسبب آثار التخدير للدواء الذي تلقيته، والتي يمكن أن تعيق مهاراتك الحركية الدقيقة وحكمك على الأمور، ينبغي **خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة** أن لا تقوم بما يلي:

القيادة

تشغيل الآليات

استعمال أدوات أو معدات كهربائية خطرة

العمل في أماكن مرتفعة (مثلاً: على سلّم)

تناول الكحول

أخذ مخدرات ترفيهية

السباحة أو المشاركة في نشاطات رياضية

ومن المفروض

أن تتابع أخذ أدويتك المعتادة

أن يصبح بإمكانك متابعة نشاطاتك المعتادة بعد ٢٤ ساعة أو كما يتم إرشادك.

موعد مراجعتك المقبلة هي كما يلي:

_____

_____

للمزيد من الراحة من الوجع (إذا لزم ذلك) ينبغي أن تأخذ:

_____

_____

إذا كانت لديك مخاوف أو حصلت لك مشاكل صحية خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة أو قبل مراجعتك فينبغي أن تتصل بقسم الطوارئ في مستشفاك.

شَرَح هذه النصيحة:

الاسم: _____ الوظيفة: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____

أعدّ هذه النشرة ECI في نيسان/أبريل ٢٠١٣ استناداً إلى إستمارة «إرشادات للبالغين المسرّحين بعد علاج استخدم فيه التخدير» الصادرة عن قسم الطوارئ في مستشفى لفربول. نتوجه بالشكر للدكتورة تامي وو – تتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني www.ecinsw.com.au

Emergency Care Institute NEW SOUTH WALES

Published Oct 2015. Next Review 2025. © State of NSW (Agency for Clinical Innovation)

تنصُّل من المسؤولية القانونية: هذه المعلومات الصحية هي لأغراض توعوية عامة فقط. يجب دائماً استشارة طبيبك أو اختصاصي صحي آخر للتأكد من ملاءمة هذه المعلومات لك.