

# التخدير الخاص بالإجراءات الطبية

من ضمن علاجك في قسم الطوارئ تم إعطاؤك دواءً مخدراً أثناء الإجراء الطبي التالي لك:

نقترح عليك أن ترتاح خلال الـ ١٢ ساعة المقبلة لتتيح لمفعول هذه الأدوية أن يتلاشي كلياً. بسبب آثار التخدير للدواء الذي تلقيته، والتي يمكن أن تعيق مهاراتك الحركية الدقيقة وحمكك على الأمور، ينبغي خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة أن لا تقوم بما يلي:

- ◆ القيادة
- ◆ تشغيل الآليات
- ◆ استعمال أدوات أو معدات كهربائية خطيرة
- ◆ العمل في أماكن مرتفعة (مثلاً: على سلم)
- ◆ تناول الكحول
- ◆ أخذ مخدرات ترفيهية
- ◆ السباحة أو المشاركة في نشاطات رياضية

## ومن المفروض

- ◆ أن تتابع أخذ أدويةك المعتادة
  - ◆ أن يصبح بإمكانك متابعة نشاطاتك المعتادة بعد ٢٤ ساعة أو كما يتم إرشادك.
- موعد مراجعتك المقبلة هي كما يلي:

للمزيد من الراحة من الوجد (إذا لزم ذلك) ينبغي أن تأخذ:

إذا كانت لديك مخاوف أو حصلت لك مشاكل صحية خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة أو قبل مراجعتك فينبغي أن تتصل بقسم الطوارئ في مستشفىك. شَرَح هذه النصيحة:

الاسم: \_\_\_\_\_ الوظيفة: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_



أعدت هذه النشرة ECI في نيسان/أبريل ٢٠١٣ استناداً إلى إستمارة «إرشادات للبالغين المسرّحين بعد علاج استخدم فيه التخدير» الصادرة عن قسم الطوارئ في مستشفى لفربول. نتوجه بالشكر للدكتورة تامي وو - تتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني [www.ecinsw.com.au](http://www.ecinsw.com.au)