환자 안내자료

병원:

맹장염이 있는 걸까요?

초기 맹장염은 가끔 진단하기가 꽤 어렵습니다. 많은 사람들이 복통 증세로 매일 응급실을 찾지만 소수만이 맹장염으로 밝혀집니다. 당신을 진단한 의사의 소견은 맹장염일 가능성이 없을 것이라고 하지만 증세는 변할 수 있으므로 그 소견이 100% 항상 확실하지는 않습니다.

차후 24시간 동안 아래와 같은 예방조치를 따르는 것이 중요합니다.

- 휴식 – 신체 활동 혹은 격렬한 활동을 피한다.
- 평상 시의 식사와 음료를 섭취한다.
- 옆에서 당신을 지켜볼 수 있는 사람과 함께 있도록 한다.
- 여행을 피하고 특별히 장시간이 소요되는 혹은 외딴 지역으로의 여행을 피한다.
- 파라세타몰 (paracetamol, 1알에 500mg, 2알을 하루에 4번)과 같은 간단한 진통제를 복용할 것이 권장된다.
- 다음과 같은 증상이 나타나면 가정의 (GP)를 보거나 응급실로 간다.
  - 통증이 커지거나 지속될 때
  - 계속되는 구토
  - 고열
  - 밤에 땀을 흘리거나 오한이 있거나 몸이 떨릴 때
  - 증상이 좋아지지 않을 때.

당신의 증세가 진정될 것으로 예상되지만 위의 조언을 따르고, 우려사항이 있을 경우 추후 도움을 구하는 것이 중요합니다.

의문점이 있으면 병원을 떠나기 전에 의사나 간호사에게 문의하십시오.

지침:

_____

_____

_____

_____

_____

도움 요청:

의료 응급 상황시 가장 가까운 응급실로 가거나 000으로 연락하십시오.

2014년 8월에 Royal North Shore 병원의 응급실 퇴원 정보에 기초하여 ECI에서 만듦 - 웹사이트 www.ecinsw.com.au를 통해 온라인으로도 볼 수 있음

Emergency Care Institute NEW SOUTH WALES

Published Oct 2015. Next Review 2025. © State of NSW (Agency for Clinical Innovation)

면책 조항: 이 의료 안내자료는 일반적인 교육 목적만을 위해 만들어졌습니다. 이 안내자료가 당신에게 해당되는 지를 확인하기 위해서는 주치의나 다른 의료진들에게 항상 상담을 받아야 합니다.