

我是否患有闌尾炎？

闌尾炎早期有時較難診斷。每天因腹部症狀到急診科就診的很多人中，只有幾個人有闌尾炎。醫生已經為您進行診視，且認為您不大可能有闌尾炎，但因為症狀可能改變，因此並非總是可以100%確定。

接下來24小時應遵守以下事項，這很重要：

- ◆ 休息——避免運動或劇烈活動。
- ◆ 正常飲食攝取。
- ◆ 確保身邊有人隨時注意您的情況。
- ◆ 避免旅行，尤其是長時間或到邊遠地區旅行。
- ◆ 建議服用單純止痛藥物，比如撲熱息痛 (2片(每片500mg) 每天四次)。
- ◆ 一旦以下任一情況發生，請看全科醫生或回到急診科：
 - ◆ 加深或持續疼痛
 - ◆ 持續嘔吐
 - ◆ 高燒
 - ◆ 夜汗、寒顫或發抖
 - ◆ 病情未改善。

我們預期您的症狀將自行消退，但請遵守以上建議，這一點很重要。如有顧慮請即尋求進一步幫助。

若您有任何問題，請在離開醫院前向醫生或護士諮詢。

醫囑：

尋求幫助：



如需急診請去往距您最近的醫院急診科或撥打000。

2014年8月由ECI編寫，基於皇家北岸醫院急診科出院資訊 (Royal North Shore Hospital ED Discharge Information) — 也可在 www.ecinsw.com.au 網站線上查閱



Emergency
Care Institute
NEW SOUTH WALES