

# 치료과정의 진정제 투여

응급실에서 진료의 일부로써 다음과 같은 치료중에 진정제가 투여될 수 있습니다:

진정제의 효과가 완전히 사라질 때까지 투여후 12시간 동안 휴식을 취할 것을 권합니다.

투여받은 약의 진정 효과 때문에 섬세한 기능 및 판단력에 장애가 올 수 있으므로 **차후 24 시간 동안 다음과 같은 활동을 하지 마십시오:**

- ◆ 운전
- ◆ 기계 작동
- ◆ 위험성이 있는 전기 도구 혹은 전동 공구 사용
- ◆ 높은 곳에서의 작업 (예: 사다리 오르기)
- ◆ 음주
- ◆ 기분 전환 약제 복용
- ◆ 수영 혹은 스포츠 활동 참여

**반드시 명심할 사항**

- ◆ 평소대로 먹던 약을 계속해서 복용
- ◆ 24시간 후 혹은 권장된 대로 정상적인 활동으로 돌아갈 수 있어야 함.

후속 예약 날짜:

통증 경감이 더 필요할 때 복용해야 될 약:

차후 24시간 동안에 어떤 우려나 문제가 생겼을 때 혹은 후속 예약을 하기 전에 반드시 병원의 응급실에 연락을 해야합니다.

아래 의료진이 위의 통지 사항을 설명했습니다:

이름: \_\_\_\_\_ 직함: \_\_\_\_\_

사인: \_\_\_\_\_ 날짜: \_\_\_\_\_