患者情况说明书

医院：

程序镇静

Procedural Sedation | Chinese Simplified

作为急诊室治疗的一部分，医务人员会对您进行药物镇静，在镇静期间进行了以下程序：

_____

_____

建议您在接下来十二小时内静养，让药物影响充分消除。

由于药物的镇静效果，您的精细技能及判断力可能受到影响。**接下来二十四小时中**，您**不应**：

- 开车
- 操作机械
- 使用危险电动设备或电动工具
- 高处作业（如踩在梯子上工作）
- 饮酒
- 吸毒
- 游泳或体育运动

您**应当**

- 继续服用平时服用的药物
- 24小时后（或遵医嘱）能够恢复正常活动

您的复诊安排为：

_____

_____

如有需要进一步止痛，请服用：

_____

_____

若在接下来24小时内，或在约定的复诊时间前有任何顾虑或问题，您应联络医院急诊科。

本指南由以下人员进行解说：

姓名：_____ 职务：_____

签名：_____ 日期：_____

2013年4月由ECI编写，基于利物浦急诊科程序镇静出院成年人咨询表（Liverpool ED Procedural Sedation Discharge Adult Advice form）。
感谢Tammy Wu医生 — 也可在 www.ecinsw.com.au 网站在线查阅。

Emergency Care Institute
NEW SOUTH WALES

Published Aug 2016. Next Review 2025. © State of NSW (Agency for Clinical Innovation)

免责声明：本医疗信息仅用于普及教育目的。一定要向医生或其他医疗专业人员求教，以确保本信息是适合您的。