

蜂窝性组织炎

什么是蜂窝性组织炎？

你被诊断患有蜂窝性组织炎。这是一种细菌在皮肤和周边组织扩散导致的感染病症。导致蜂窝性组织炎的常见细菌是葡萄球菌。葡萄球菌通常存活在皮肤表面，但是不会造成感染或是任何种类与链球菌有关的感染。

为什么我会患上蜂窝性组织炎？

感染通常是因为你的皮肤表面破裂或有伤口。

具体的原因可能包括：

- 被昆虫/蜘蛛叮咬。
- 擦伤。
- 皮肤有干湿疹、疥疮或粉刺等皮肤问题。
- 皮肤被诸如金属、玻璃和土石等异物损伤。
- 实施手术之后。

如果你的腿部有水肿（无论是何原因），尤其是你有糖尿病或正在服用影响免疫系统的药物，你患上蜂窝性组织炎的机率就较大。如果你吸烟，也会增加蜂窝性组织炎的患病机会。

但是，有时候病因并不清楚。

医院急诊部能够为我做些什么？

在通常情况下，受感染的部位出现疼痛和红肿时，你应该前往急诊部就诊。你也可能会感到全身不适，这通常意味着情况较为严重。部分蜂窝性组织炎会导致感染部位流出清液、黄液或脓状液体。

你应该告诉医生所有的病症以及你可能对哪些物质过敏。

根据你的蜂窝性组织炎的严重程度，以及你是否还有其他病症或行动问题，你可能在医院或家中接受治疗，或只是简单地需要服用一些口服抗生素。

首次前往医院急诊部时，医护人员可能会为你静脉注射抗生素。之后，你可继续住院治疗（如果身体情况不好）。如果病情允许，你可出院回家，由护士上门继续为你注射。你的 GP 医生也可以为你提供这项服务。

根据不同病情，医生可能需要对你进行多项检验。如果病情严重，检查项目可能包括蜂窝性组织炎涂片化验以及验血。

流汗和发烧都是很重要的症状，你必须告诉医生。

医生通常会用笔在蜂窝性组织炎感染部位作记号，以便评估感染是否继续扩散或有所消减。尽量不要将这些记号清洗掉。

蜂窝性组织炎

出院回家之后应该做些什么？

你必须记得按时按量服用医生处方的抗生素。医院也可能安排护士上门为你静脉注射。注射抗生素数日之后，你可改口服药。如果你在部分地区居住，或许可以返回医院急诊部复诊。

你一定要服用完成一个疗程的抗生素。

你也必须与自己的医生跟进，了解化验结果，复诊自己的蜂窝性组织炎情况。

蜂窝性组织炎不会马上痊愈。抗生素通常在服用后 12 至 24 小时才会起效。红肿开始消减还需要更长的时间。蜂窝性组织炎通常不会很快扩散。

但是，如果出现这个情况，你必须立刻看医生。

如果你开始流汗或发烧，你也必须立刻看医生。

寻求帮助：



如有紧急情况，你可以前往最近的医院急诊部或致电 000。



*Emergency
Care Institute*
NEW SOUTH WALES

在家中治疗的重要注意事项

你应该在家中休息，直至蜂窝性组织炎稳定为止。

你必须把受感染的部位抬高。也就是说把感染部位抬高至自己的心脏高度。你可在躺椅、床或沙发上放一些枕头达到这个目的。这是帮助你尽快恢复的最重要方法之一。

确保纱布绷带完好无损，并根据要求更换。

记得经常洗手。

按照医嘱服用止痛药和抗生素。

要求：
